

# Azathioprin (Imurel)

Til patienter og pårørende

OUH  
Stræber efter kvalitet i alt

## Azathioprin (Imurel) - lægemiddelinformation

Her kan du læse generel information om Azathioprin.  
Læs indlægssedlen i pakken for flere oplysninger.

### Form

Azathioprin gives som tabletter, der *ikke* må deles eller knuses.

### Virkning

Azathioprin hæmmer kroppens immunceller, og dæmper på den måde betændelsesreaktioner. Kan gives sammen med Prednisolon, for at reducere Prednisolondosis.

### Mest almindelige bivirkninger

Da behandlingen påvirker immunforsvaret, har du øget risiko for at få infektioner. Nogle oplever desuden kvalme, opkastning, diarré og appetitløshed. Disse bivirkninger er oftest mest udtalte i starten og kan mindskes ved at tage tabletterne lige efter et måltid, eller lige inden du går i seng. Nogen oplever øget hårtab.

### Forholdsregler

Når du får Azathioprin, skal du regelmæssigt have taget blodprøver, specielt med hensyn til levertal, blodprocent, hvide blodlegemer og blodplader.  
Ved tegn på infektion (feber), bør du kontakte en læge.

### Graviditet og amning

Azathioprin bør kun anvendes under graviditet efter aftale med lægen. Hvis du ammer, bør du ikke anvende Azathioprin.

Kontakt altid lægen eller sygeplejersken, hvis du mener, der skal justeres i din medicin.

Venlig hilsen

Personalet  
I-enheden  
Lungemedicinsk Afdeling J  
Tlf. 65 41 27 27