

Blæreskylning med BCG - behandling efter operation og vedligeholdelsesbehandling

Til patienter og pårørende

Behandling efter fjernelse af overfladisk (T1a) blæretumor og/eller CIS

Du har fået fjernet en overfladisk blæretumor ved en operation og tilbydes nu 6 blæreskylninger med BCG (Calmettevaccine) for at forebygge tilbagefald.

Hvad er BCG ?

BCG er en vaccine, som stimulerer kroppens eget immunforsvar mod de celleforandringer, du har i blæren.

Vaccinen er den samme som den Calmettevaccine, der anvendes som forbyggelse mod tuberkulose.

Vaccinen består af svækkede bakterier.

Blæreskylningerne foregår ambulantly 6 gange med 1 uges mellemrum.

Derefter skal du til kontrolundersøgelse af din blære, og er den tilfredsstillende overgår du til et vedligeholdelses program.

Programmet består af 3 installationer hver 6. måned i 3 år.

Før behandlingen

Hvad sker på en typisk installationsdag - Hvilke sikkerhedsregler skal man holde sig til?

4 timer før mødetidspunktet bør du drikke sparsomt.

Lad ikke vandet lige inden behandlingen, og lad helst ikke lade vandet de første 2 timer efter behandlingen

Behandlingen

Din urin vil blive undersøgt for bakterier enten før eller efter kateteret er anlagt og inden behandlingen. Hvis den tyder på at du har en urinvejsinfektion eller der er tegn på blod, må BCG ikke gives.

Såfremt din urin er tilfredsstillende skylles blæren med BCG blandet med 50 ml saltvand. Du skal forblive i ambulatoriet i 15min. efter indhældningen i tilfælde af en allergisk reaktion,

som dog ses sjældent. Ved en problemfri installation må man efterfølgende tage hjem. Efter behandlingen BCG skal virke i blæren i 2 timer, derefter skal du lade vandet. Hvis det ikke er muligt for dig at holde på BCG i blæren i de 2 timer, skal du informere os ved næste fremmøde. Du skal sidde ned ved første vandladning for at undgå stænk af BCG (gælder også mænd) og gerne i dit eget hjem. Blæren skal tømmes fuldstændigt -er du i tvivl om du har tømt, så forsøg vandladning igen efter 5min.

Hygiejne og forholdsregler og efterbehandling

Toilettet må ikke skylles med det samme (begrundelse senere i teksten). Vask dine hænder og genitalier grundigt. (penis og urinrørsåbning) Kom klor svarendetil indholdet af låget på dunken x 2 itoilettet eller toiletrens (aldrig begge dele) af tilsvarende mængde. Lad det virke i 15-20 min. Skylderefter toilettet. På den måde undgår man at andre i familien smittes. I løbet af de næste 6 timer bør du blive hjemme og gentage punkterne hver gang du lader vandet. Drik rigeligt i løbet af dagen for at skylle din blære godt igennem.

Bivirkninger og gener efterbehandling

Svie ved vandladning samt hyppig vandladning ses hyppigt og varer oftest 1-2 døgn efter hver skylning. Feber op til 38,5 grader og influenzasymptomer med almenutilpashed, kuldefølelse og muskelsmerter kan optræde nogle timer efter skylningen. I de fleste tilfælde forsvinder symptomerne igen i løbet af 12 til 24 timer. Det kan hjælpe at tage et mildt smertestillende middel, f.eks. Panodil 1g. Blod i urinen kan ses i de første dage efter hver behandling. I sjældne tilfælde optræder mere udtalte bivirkninger.

Blæreskylning med BCG - behandling efter operation og vedligeholdelsesbehandling

Hvis du oplever én af følgende

bivirkninger, bør du kontakte os telefonisk:

Svie ved vandladning og hyppigvandladning i 2 døgn eller mere

Kraftig blødning i urinen.

Feber til 38,5 grader i mere end 24 timer eller temperaturstigning til over 39 grader.

Hvis du følger dig mere syg, end hvad der er normalt for en almindelig influenza.

Du kan ringe til:

Urinvejskirurgi, Sengeafsnit A, Sønderjylland, Sønderborg, tlf. 79 97 38 11.

BCG behandling og sex

Kvinde: undgå samleje i 48 timer efter BCG skylning.

Mand: brug kondom igennem hele 6 ugers BCG installationsperioden og indtil 6 uger efter afslutning for en sikkerheds skyld!

HUSK! BCG er svækkede, men levende bakterier som kan påvirke andre!

I de fleste tilfælde er generne så beskedne, at du kan passe dit normale arbejde mellem behandlingerne.

Har du brug for antibiotikabehandling g.a. f.eks. halsbetændelse, så informer din læge om at du er i et forløb med BCG, idet antibiotikabehandling kan reducere effekten af BCG.

med venlig hilsen Personalet, Urinvejskirurgi, SHS