

Anoskopi - og evt. Rektoskopi

Til patienter og pårørende

Hvad er en Ano -og Rektoskopi ?

En Anoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen ca. 5-7 cm op i tarmen. Huden omkring endetarmsåbningen bliver inspiceret og vurderet. Ved Rektoskopi er der mulighed for at se 25 cm. op i tarmen. I nogle tilfælde tages en prøve fra slimhinden. Undersøgelsen varer 5 til 10 minutter.

Forberedelse til undersøgelsen

Det er vigtigt, at endetarmen bliver godt udrenset, for at undersøgelsen kan foretages. Du skal dog ikke være fastende.

Du bedes følge denne anvisning:

På undersøgelsesdagen

3 timer før undersøgelsen indføres spidsen af medsendte tube Glyoktyl® klyσμα i endetarmen. Indholdet klemmes ud, hvorefter tuben fjernes, stadig sammenklemt. Virkningen indtræder normalt efter 5 til 10 minutters forløb. Der kan opstå mavekneb i forbindelse med udtømningen.

Selve undersøgelsen

En Anoskopi kan være forbundet med ubehag og let ømhed.

En Rektoskopi kan være forbundet med ubehag, og det kan gøre ondt, eftersom der bliver pustet luft op i endetarmen.

Dette kan desuden bevirke ufrivillig luftafgang og afføringstrang, hvilket er normalt for undersøgelsen.

Efter undersøgelsen

Normalt ingen forholdsregler.

Du må spise og drikke, som du plejer.

Du vil blive orienteret om undersøgelsesresultatet umiddelbart efter undersøgelsen.

Hvis der er taget prøver aftales svartid.

Er der noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Urinvejskirurgi, Ambulatorium, Tlf. 79973800