

Aftrapningsplan, 60 mg Prednisolon

Til patienter og pårørende

patienten først OUH

**Kontakt til Reumatologisk Ambulatorium: Hverdage mellem kl. 8-15.
Telefon 63 20 25 06, mail www.ouh.dk/svereuma**

**GCA PREDNISOLON AFTRAPNINGSSKEMA FOR: _____
Med øjensymptomer og tyggeclaudicatio**

Blodprøver:

Tages 10 dage efter opstart af Prednisolon og derefter hver 4. uge

Kalk og D-vitamin:

Unikalk m. D-vitamin, 2 tabletter dagligt.

HUSK:

Kontakt ambulatoriet eller vagtlæge, hvis du får:

- Hovedpine
- Ondt, når du tygger
- Synsforstyrrelser
- Smerter, når du rører ved din hovedbund

Kontakt ambulatoriet, hvis de symptomer, der var årsag til, at du begyndte med Prednisolon, vender tilbage.

Læge/sygeplejerske _____

Aftrapningsplan, 60 mg Prednisolon

Dosis	Dato	Opringning/fremmøde
60 mg	4 uger	Opringning 2 uger efter behandlingsopstart
50 mg	2 uger	
40 mg	2 uger	
30 mg	2 uger	
20 mg	2 uger	Opringning ca. 12 uger efter behandlingsopstart
17,5 mg	2 uger	
15 mg	2 uger	
12,5 mg	2 uger	
10 mg	6 uger	Fremmøde ca. 24 uger efter behandlingsopstart. Indkaldelse sendes.
7,5 mg	9 uger	
5 mg	9 uger	
2,5 mg	7 uger	
2,5 mg hver 2. dag	3 uger	
0		Opringning/fremmøde mhp. afslutning.